

## ① 肋膜炎, ② 盲腸炎, ③ 쓰림 驗方

張 文 榮  
(중일당 한약방)

### 一. 肋膜炎

(1) 用法指針 有渴症者 濕性藥 先用, 無渴症者 乾性藥 先用한다 不問 乾, 濕性 12貼 정도 完效

(2) 濕性藥 金銀花 赤芍藥 烏藥 枳殼 木通 白何首烏 小茴香 半夏(薑炒) 陳皮 當歸 川芎 獨活 甘草 南星 芫 芎 刺 山甲 各 10 6貼~10貼 用 隨人參酌

(3) 乾性藥 金銀花 烏藥 赤芍藥 枳殼 木通 白何首烏 小茴香 南星 半夏 陳皮 當歸 川芎 獨活 甘草 天花粉 白芥子 各 10 酒水相半煎服 先用 6貼

### 二. 盲腸炎(3貼으로 效)

● 清腸湯 大黃 芒硝 各 2.0 牧丹皮 桃仁 瓜蒌仁 各 3.0 山查肉 草龍膽 茴香 牛芳子 各 1.0

### 三. 쓰림(조잡)

● 加味消食清鬱湯 白朮 1.4 半夏 陳皮 白茯苓 神曲 香附子 川芎 麥芽 枳角 梔子 桔梗 黃連 藿香 甘草 烏藥 厚朴 各 0.7 砂仁 0.5 木香 0.3 薑 3 10~20貼

### 四. 四象人 診斷法(參考)

命骨이 尖하면 少陽人이요, 平하면 太陰人이요, 無하면 少陰人이다 一邊은 尖하고 一邊은 平하면 少陰 少陽 兼人이다

證有 似非 不知 永爲不活이니 朝 附子요, 夕 大黃이니라

× 편집자 註 = 張선생은 乙巳生으로 當년 93세이나 건강하시다고 한다

(군산시 중앙로 3가 T 445-4832)