

# 痛風 骨髓炎(骨折傷) 驗方

成 鳳 煥  
(命泉 韓藥房)

## 痛風性 關節炎 骨髓炎(骨折傷) - 化膿性關節炎

### (1) 증상

- ① 痛風 발목이 붉게 부으면서 痛症이 極甚
- ② 骨髓, 骨折傷 부종이 심하면서 流出物이 많음

### (2) 처방

#### ● 續斷烏藥湯

續斷 50, 當歸尾 薏苡仁 金銀花 各 30 川芎 白芍藥 熟地黃 烏藥 牛膝 木果 乳香 沒藥 升麻 青皮 澤瀉 桃仁 蘇木 紅花 甘草 各 10(青皮 升麻는 引經藥)

- ① 팔 骨折 · 加 桂枝 1~20
- ② 肋骨折 加 桔梗 枳殼 白芥子
- ③ 用量 痛風 骨折傷의 1~2劑
- ④ 痛風은 尿酸의 關節蓄積으로 생기는 病이나 일단 瘀血로 보고 消瘀 止痛 接骨을 목적으로 본 處方을 구성하였다.

(3) 治例 1 13歲의 男, 발목 부위의 심한 골절로 외과 병원에서 절단하라는 진단 결과가 나왔다 건곤 일척으로 本方을 投與하여 都合 26貼으로 完治되었다

(4) 治例 2 48歲의 男, 교통사고로 발목 위 부위가 완전 절단되어 병원에서 6주 診斷이 나왔으나 본 방 투여로 치료 기간을 앞 당겼음

(경북 문경시 신흥동 T 52-7009)