

# 臨床活用驗方

編輯室

● 編輯子註 이 原稿은 3號用으로 受取하였으나 筆者姓名이 漏落되어 保留하고 여러곳으로 確認하여 보았으나 全州 會員으로 思料될 뿐 알 수 없어 再 編輯補完하여 掲載한다

## - 차례 -

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. 葛根湯活用      | 9. 小建中湯    |
| 2. 當歸四逆吳茱萸生薑湯 | 10. 小柴胡湯活用 |
| 3. 當歸芍藥散      | 11. 小青龍湯活用 |
| 4. 大防風湯       | 12. 疏風活血湯  |
| 5. 半夏瀉心湯      | 13. 五苓散活用  |
| 6. 半夏厚朴湯活用    | 14. 紫雲膏    |
| 7. 白虎加人蔘湯     | 15. 肝硬化症   |
| 8. 苓桂朮甘湯活用    |            |

(1) 葛根湯 治 一般感氣 丹毒 中耳炎

葛根 3錢 桂枝 白芍藥 各1.5錢 麻黃1錢 甘草 1錢 薑三 棗二

- ① 感氣症으로 後世方으로 治療가 잘 안될 때. 加 蒼朮 桔梗 杏仁 各2錢 石膏 1 5錢 大黃 5分
- ② 中耳炎 感氣後 難聽 加 桔梗 2錢 石膏 1.5錢 川芎 1錢 大黃 5分
- ③ 顔面神經麻痺(翳風자리를 衝擊하여 痛病이 있을 때) 加 桔梗 蒼朮 各2錢 石膏1 5錢 川芎 茯苓 附子 各1錢 大黃 5分
- ④ 蓄膿症(後世方으로 效果가 없을 때) 加 辛夷花 3錢 桔梗 2錢 石膏 1.5錢 大黃 5分

⑤ 肩臂痛(40肩 50肩 特效) 加 薏苡仁 3錢 蒼朮 2錢 茯苓 附子 各1錢

⑥ 小兒 鼻下糜爛(鼻涕多後糜爛數貼) 加 川芎 1錢 大黃 5分

(2) 當歸四逆吳茱萸生薑湯 治 凍瘡(手足冷甚)

生薑 4錢 大棗 3錢 木通 甘草 各2錢 當歸 桂枝 芍藥 細辛 各1.5錢 吳茱萸 1錢

(3) 當歸芍藥散 治 婦人懷妊 腹中疝痛 吳 虛弱者 不妊

白芍藥 4錢 當歸 川芎 各4錢 白朮 茯苓 澤瀉 各3錢

(4) 大防風湯 治 膝關節炎 特效

方藥合篇 本方에 加 金銀花 5錢

(5) 半夏瀉心湯 治 腸鳴泄瀉 下痢 十數行

甘草 3錢 半夏 2 5錢 黃芩 乾薑 人蔘 各2錢 黃連 1錢 薑三 棗二

× 糖尿病者 數年 泄瀉(洋方不效)1劑 完治

(6) 半夏厚朴湯活用 治 咽中異物感

半夏 3錢 茯苓 2 5錢 厚朴 1.5錢 蘇葉 生薑 各1錢

① 喪夫後 失物로 火病이 대단한 病病에 有效

② 妊娠 惡阻症 合 八物湯 有效

(7) 白虎加人蔘湯 治 糖尿病初期 癢疹 搔痒症

石膏 8錢 粳米 4 5錢 知母 3錢 人蔘 1.5錢 甘草 1錢

(8) 苓桂朮甘湯活用 治 起立性眩暈

茯苓 4錢 桂枝 3錢 白朮 甘草 各2錢

① 渴症에 合 五苓散

② 貧血性 動悸 息切 顔面浮症 合 四物湯

③ 眼科 一般疾患(結膜炎 視力障礙) 加 車前子 1 5錢 細辛 黃連 各5分

(9) 小建中湯 加 當歸 黃芪 各1.5錢 人蔘 1錢

① 小兒體質虛弱者 體質改善 小兒便秘 小兒夜啼症(腹痛) 夜尿症(神經性 夜啼症에는 甘麥大棗湯이다)

(10) 小柴胡湯(方藥合篇) 活用

① 結核性 淋巴腺炎 耳下腺炎 加 桔梗 2錢 石膏 1.5錢

■ 臨床活用驗方

- ② 感氣後 難聽 加合 香蘇散
- ③ 産後熱症 合 四物湯
- ④ 搔爬手術 殘有物로 下血不止者(膠艾四物湯으로 不效者) 合 桂枝茯苓湯
- ⑤ 肋膜炎症(慢性氣管支炎症 小青龍湯不效하고 口苦 胸痛者에 用)
- ⑥ 圓形脫毛症者 宜用

(11) 小青龍湯(方藥合篇) 活用

- ① 慢性氣管支炎 氣管支 喘息 加 桔梗 2錢 石膏 1 5錢 杏仁 1錢
- ② 圓形脫毛症 數次得效 全州市會員들도 多數使用 得效하였음

(12) 疎風活血湯(方藥合篇)

- ① 류마치성 紫斑病, 血小板減少性 紫斑病에 有效

(13) 五苓散(方藥合篇)活用 治 小兒吐瀉 吐乳 水疱性皮膚炎

- ① 慢性偏頭痛 合 清上鑷痛湯
- ② 陰囊水腫 加 車前子 1.5錢 木通 1錢

(14) 紫雲膏 治 濕疹 乾癬 角皮症 圓形性脫毛

胡麻油 1000cc 黃蠟 380g 紫根 當歸 各100g 豚脂 25g

× 參考文獻 韓方診療醫典 傷寒論 韓方醫療百科 黃漢醫學

〈附記〉 以上은 全州會員이 보내온 것임

(15) 治肝湯 治 肝硬化症

金銀花 白芍藥酒炒 各2錢 白朮 陳皮 山查肉 香附子 當歸 各1.5錢 半夏 牡礪粉 麥芽  
小茴香 枳殼 甘草 各1錢 梔子 青皮 龍膽草 各8分 三稜 蓬朮(竝酒炒) 檳榔 各5分

- 用法 · 食後 30~60分服 1日 3回
- 注意 鷄猪酒

〈附記〉 治肝湯은 경북 영천시 화룡동에서 김윤탈씨가 보내온 것임