

# 婦人科調經

尹 德 重



## ●脈

寸口脈 浮而弱 浮則爲虛 弱則無血  
尺脈來而斷絕者 月水不利  
尺脈滑 血氣實 婦人經脈不利

## ●凡

婦人 宜益榮衛 滋氣血

## ●治驗例

- ① 經水 或前或後或多或少或踰月不至或一月兩來者 宜 四物湯 加 麥門冬 吳茱萸 人參 半夏 牡丹皮 肉桂 阿膠珠 甘草 各4g
- ② 經水 不及期而來者 宜 四物湯 加 阿膠珠 艾葉 條芩 黃連 黃栢 知母 香附子 甘草 各4g
- ③ 經水 過期而不行者 宜 四物湯 加 桃仁 紅花 香附子 肉桂 蓬朮 蘇木 木通 甘草 各4g
- ④ 經水欲行 臍腹級痛 臨徑者 血澁 宜 四物湯 加 川練子 小茴香 木香 檳榔 玄胡索 各4g
- ⑤ 經水將來 腹中陳 作痛 乍作乍止 氣血俱實者 宜 四物湯 去 熟地黃 加 生地黃 黃連 香附子 桃仁 紅花 玄胡索 牡丹皮 各4g
- ⑥ 經水過多 得五心煩熱 日晡潮熱 宜 四物湯 胡黃連 8g, 2~3貼 服用效
- ⑦ 婦人 骨蒸勞熱 潮熱 宜 四物湯 加 地骨皮 牡丹皮 各6g

■ 婦人科 調經

- ⑧ 婦人 逆經吐血 不止者 宜 四物湯 加 大黃酒炒 1兩 水煎童便服
- ⑨ 婦人 遇經來 沐浴 身痛 手足麻痺 或 生寒熱 頭痛 目眩 此乃觸經感冒  
宜 五積散 去 乾薑 加 羌活 獨活 牛膝 各4g 干葱煎服  
咳嗽 加 杏仁 五味子, 泄瀉 去 枳角 加 肉豆蔻
- ⑩ 婦人 下體腫痛者 宜 人蔘敗毒散 加 蒼朮 黃栢 威靈仙 各4g .

×參考 . 上記驗方은 1960~70年度에 광주 前木浦藥房〔三誠堂韓藥房〕 김승호 선생님께서 家傳하여 애용하시고 본인 역시 傳受하여 屢次臨床해본 결과 많은 效가 있어 우선 10여가지 처방을 발표합니다

(전남 나주시 반남면 흥덕리 25 영생당한약방 ☎ 061-336-1461)